



# Chlamydia et gonorrhée SEXUELLEMENT ACTIF ET MOINS DE 30 ANS?

## Il serait bon de vous faire dépister.

Si vous avez déjà eu des relations sexuelles orales, vaginales ou anales, vous êtes une personne sexuellement active.

### Pourquoi?

- De nombreuses personnes infectées ne présentent pas de symptômes.
- La chlamydia et la gonorrhée peuvent entraîner une infection douloureuse des organes génitaux, de la douleur chronique, et même de l'infertilité.
- Ces infections peuvent être traitées avec des antibiotiques.



### Où?

Il est possible de subir un test dans un cabinet de médecin ou une clinique médicale.



**Choisissez l'option qui vous convient le mieux.**



### Comment?

Généralement, on procède à un prélèvement d'urine ou vaginal.



### Votre resultat

Si vous obtenez un résultat positif, vous devrez prendre des antibiotiques et éviter toute relation sexuelle pour **une semaine**.

- Il est possible de subir d'autres tests plus tard pour éliminer la possibilité d'une ré-infection.

Si vous obtenez un résultat négatif, **continuez à vous protéger lors des relations sexuelles**.

**Discutez avec votre médecin des options qui s'offrent à vous.**



### Santé publique

Les cas de chlamydia et de gonorrhée sont automatiquement signalés aux autorités de santé publique.

Une infirmière en santé publique peut communiquer avec les personnes infectées pour faciliter la **recherche des contacts**. Elle avise, de façon **confidentielle**, leurs partenaires sexuels pour qu'ils se fassent dépister et qu'ils soient traités, au besoin.



### Faux Positifs

Aucun test n'est infaillible; un **faux positif** peut survenir.

Si vous obtenez un résultat positif, essayez de **rester calme** et **parlez-en avec votre médecin**.

