Questions du public

Q: C’est commun la chlamydia et la gonorrhée?

R: De 5 à 7 % des personnes sexuellement actives de moins de 30 ans auraient la chlamydia.Ce pourcentage est toutefois plus faible pour la gonorrhée : environ 1 % des personnes de moins de 30 ans en seraient atteintes.

GECSSP

Questions du public

Q: Qui devrait subir un test?

R: Les personnes de moins de 30 ans qui ont des relations anales ou vaginales ou du sexe oral.

GECSSP

Questions du public

Q: **Et si je suis dans la trentaine?**

R: Si vous changez de partenaire ou si ces infections vous préoccupent, parlez-en avec votre médecin ou votre infirmière. Le taux d'infection est beaucoup plus bas chez les personnes de plus de 30 ans que chez celles de moins de 30 ans.

GECSSP

Questions du public

Q: Est-ce que toutes les personnes de moins de 30 ans devraient subir un dépistage?

R: Le dépistage est recommandé chez toutes des personnes sexuellement actives de moins de 30 ans.

GECSSP

Questions du public

Q: Comment ces infections sont-elles transmises?

R: Elles sont transmises au cours de relations sexuelles anales ou vaginales ou lors de sexe oral.

GECSSP

Questions du public

Q: Pourquoi en faire tout un plat?

R: Si elles ne sont pas traitées, la chlamydia et la gonorrhée peuvent entraîner une Infection des organes génitaux, de la douleur et même l'infertilité.

GECSSP

Questions du public

Q: J’ai subi un test Pap. Ai-je subi un dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée en même temps?

R: Pas nécessairement. Il s’agit de tests différents, bien qu’ils soient parfois réalisés en même temps.

GECSSP

Questions du public

Q: **Dépistage » et « test » sont-ils synonymes?**

R: Dans ce cas-ci, oui.

GECSSP

Questions du public

Q: L'absence de symptômes veut-elle dire que je n'ai pas contracté l'infection?

R: Non. De nombreuses personnes atteintes de la chlamydia ou de la gonorrhée ne présentent pas de symptômes. Il est préférable de subir un test.

GECSSP

Questions du public

Q: Quels sont les symptômes d'infection?

R: Les symptômes d'infection comprennent une sensation de brûlure ou des démangeaisons au niveau du vagin, de l'anus ou du du pénis, ainsi que de la douleur, un écoulement et parfois une légère fièvre.

GECSSP

Questions du public

Q: Pourquoi dépiste-t-on à la fois la chlamydia et la gonorrhée?

R: Le test disponible dépiste les deux infections en même temps.

GECSSP

Questions du public

Q: En quoi consiste le dépistage?

R: Généralement, on procède à un prélèvement d'urine ou vaginal.

GECSSP

Questions du public

Q: Quel type d'échantillon est utilisé pour le test?

R: N'importe qui peut fournir un échantillon d'urine. Un prélèvement vaginal peut être réalisé chez les personnes de sexe biologique féminin.

GECSSP

Questions du public

Q: Mon médecin me fera-t-il systématiquement subir un test?

R: Si vous êtes une personne sexuellement active de moins 30 ans, il est probable que votre médecin vous offre de passer un test une fois par année.

GECSSP

Questions du public

Q: **Le test est-il douloureux?**

R: Non.

GECSSP

Questions du public

Q: Le dépistage a-t-il des effets secondaires?

R: Certaines personnes peuvent éprouver du stress, mais on devrait vous l'offrir de façon à ce que vous ne soyez pas mal à l'aise. Ce test de routine permet de dépister des infections qui, si elles ne sont pas reconnues, peuvent entraîner des problèmes de santé.

GECSSP

Questions du public

Q: Où subir un dépistage pendant la pandémie?

R: Dans un cabinet de médecin ou une clinique médicale.

GECSSP

Questions du public

Q: Combien de temps faut-il pour obtenir les résultats?

R: Il faut de 24 à 48 heures, parfois plus selon votre lieu de résidence et les services qui y sont offerts.

GECSSP

Questions du public

Q: Je n'ai pas eu de relations sexuelles récemment. Dois-je tout de même subir un test?

R: Si vous avez eu des relations sexuelles par le passé, vous devriez faire le test.

GECSSP

Questions du public

Q: Et si je n'ai eu qu'un seul partenaire?

R: Il est tout de même bon de faire un test.

GECSSP

Questions du public

Q: Et si mon partenaire et moi n'avons pas de relations sexuelles avec d'autres personnes?

R: Si vous avez moins de 30 ans, le dépistage est tout de même souhaitable. Certaines personnes peuvent avoir été infectées au cours d'une relation antérieure.

GECSSP

Questions du public

Q: Je le saurais si mon partenaire avait l'une de ces infections?

R: De nombreuses personnes ne présentent pas de symptômes. Un dépistage est recommandé.

GECSSP

Questions du public

Q: Comment traite-t-on ces infections?

R: La chlamydia et la gonorrhée sont facilement traitées avec des antibiotiques.

GECSSP

Questions du public

Q: Qu'arrive-t-il si on ne se fait pas traiter?

R: Les femmes (d'après le sexe à la naissance) peuvent développer une infection douloureuse des organes génitaux qui peut entraîner de la douleur chronique, et même de l'infertilité. Les hommes peuvent présenter des symptômes légers, mais transmettre l'infection à leurs partenaires.

GECSSP

Questions du public

Q: Peut-on attraper la chlamydia ou la gonorrhée lors de sexe oral?

R: Oui, il est possible d'attraper ces infections avec du sexe oral ou des relations sexuelles vaginales ou anales.

Questions du public

Q: Peut-on en être atteint plus d'une fois?

R: Oui. C'est pourquoi il est bon de se faire dépister chaque année.

GECSSP

Questions du public

Q: À quelle fréquence devrais-je subir un test?

R: Une fois par année devrait suffire. Cependant, n'attendez pas un an si vous croyez être à risque.

Questions du public

Q: Comment prévenir la chlamydia et la gonorrhée?

R: Protégez-vous lors des relations sexuelles; servez-vous par exemple d'un condom, d'un préservatif féminin ou d'une digue.

GECSSP

Questions du public

Q: Que faire si j'ai un résultat positif? Puis-je subir un autre test?

R: Parlez-en avec votre médecin ou votre infirmière.

GECSSP

Questions du public

Q: Peut-on avoir un faux positif au test?

R: C’est possible. Parlez-en avec votre médecin ou votre infirmière

GECSSP

Questions du public

Q: Qu'est-ce qu'un faux positif?

R: Un faux positif est un résultat positif obtenu sans qu'une infection soit présente.

GECSSP

Questions du public

Q: Que se passe-t-il si j'ai un résultat positif?

R: Vous devrez prendre des antibiotiques et éviter toute relation sexuelle pour une semaine.

GECSSP

Questions du public

Q: Quelles autres précautions devrais-je prendre?

R: Utilisez un condom, avisez votre ou vos partenaires, et subissez un nouveau test six mois plus tard.

GECSSP

Questions du public

Q: Pourquoi ces infections sont-elles signalées aux autorités de santé publique?

R: Pour que les partenaires soient avisés, subissent un dépistage et soient traités.

GECSSP

Questions du public

Q: À quelle fréquence devrais-je passer un test?

R: Si votre risque d'infection n'est pas élevé, une fois par année suffit.

GECSSP

Questions du public

Q: Quelles personnes courent un risque accru?

R: Les personnes qui ont déjà contracté une infection transmise sexuellement, qui ont plusieurs partenaires ou qui n'utilisent pas de condoms.

GECSSP