




### نتائج فحص 1.000 رجل بفحص مستضد البروستاتا النوعي (PSA)\*



### ما هي المخاطر التي يمكن أن أتعرض لها إذا لم أخضع للفحص؟

- من بين الرجال في سن 55 إلى 69 سنة الذين لم يتم فحصهم بفحص PSA، يكون خطر الوفاة من سرطان البروستاتا هو 6 لكل 1,000.
- مع فحص PSA المنتظم، قد ينخفض خطر الوفاة من سرطان البروستاتا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 69 عاما إلى 5 لكل 1000.
- في كثير من الحالات، سرطان البروستاتا لا يشكل ولن يشكل أي تهديد على حياة الرجل.

### أليس من الأفضل أن يتم فحصك بدلا من عدم القيام بأي شيء؟

- غالبا ما يؤدي الفحص باستخدام PSA إلى مزيد من الاختبارات، والتي تحمل معها مخاطرها ومشاكلها الخطيرة.
- على سبيل المثال، تتضمن الخزعة عددا من الأضرار المحتملة مثل التلوث أو الدم في البول أو حتى الموت.
- بالإضافة إلى ذلك، إذا أدى الاختبار إلى العلاج، مثل استئصال البروستاتا (إزالة غدة البروستاتا)، تزداد فرص سلس البول وضعف الانتصاب بشكل كبير. ومضاعفات أخرى قصيرة المدى بعد الجراحة تشمل التلوث والعمليات الجراحية الإضافية وعمليات نقل الدم والوفاة. لفة بطريقة أبطأ بسبب

### ما الذي يوصي به فريق المهام الكندي بشأن الرعاية الصحية الوقائية؟

- استنادا إلى عدم وجود أدلة مقنعة على أن فحص المستضد البروستاتا النوعي PSA يقلل من وفيات سرطان البروستاتا، واستنادا إلى الأدلة الثابتة على أن الفحص والعلاج الفعال يؤدي إلى ضرر، يوصي فريق المهام الكندي بشأن الرعاية الصحية الوقائية (CTFPHC) بعدم استخدام اختبار PSA للكشف عن سرطان البروستاتا.
- للمزيد من المعلومات عن توصيات فريق المهام الكندي بشأن الرعاية الصحية الوقائية، قم بزيارة موقع الويب [www.canadiantaskforce.ca](http://www.canadiantaskforce.ca) لفة باعة بالعنان للطبعها خلال التصمم

### ما هي مزايا الفحص؟

- تقليل مخاطر الوفاة من سرطان البروستاتا - شخص واحد (1) من بين 1000 رجل سوف ينجو من الموت بسرطان البروستاتا بسبب خضوعه لفحص PSA، إلى ال باستخدام شفية